

Laboratoires Prodene Klint 1<sup>er</sup> fabricant de produits d'hygiène cutanée

# Septigel +



## Protégez vos salariés avec le gel hydroalcoolique Septigel +

La transmission par les mains directe ou indirecte est la première cause de transmission des germes.

**Septigel +** est un moyen simple, efficace et économique pour palier au risque de contamination.



Dans les sanitaires.



Salle de réunion : lieu confiné où la proximité peut engendrer des transmissions.

VIRUS

**H1N1\***

CHAMPIGNONS

BACTERIES

Septigel + détruit  
**99,99%**  
des germes.\*\*



L'accueil de l'entreprise : lieu de passage et de rencontre.



Au bureau, au contact des ordinateurs, des téléphones et fournitures de bureau.

Listé à la SFHH  
(Société Française  
d'Hygiène Hospitalière).  
Formule utilisée en  
milieu hospitalier.



LABORATOIRES  
Prodene Klint

LABORATOIRES PRODENE KLINT - 8, rue Léon Jouhaux - 77183 CROISSY BEAUBOURG  
Tél. 01 60 95 49 00 - Fax : 01 60 95 49 49 - <http://www.prodene-klint.com>

\*selon la norme européenne EN 14476. \*\*selon la norme européenne EN 1500.

## DESIGNATION

## REF.

## CONDIT.

LABORATOIRES  
Prodene Klint

**vous proposent  
une gamme complète  
de gels hydroalcooliques  
Septigel +**

**COMPOSITION :** Ethanol (CAS n° 64-17-5, 60% m/m), d'alcool isopropylique (CAS n° 67-63-0, 15% m/m) et de surgraissant.

**NORMALISATION :** EN 1040, 30sec + Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM). EN 1275, Candida albicans (30sec), Aspergillus niger (1min). EN 1500, 3ml, 30sec. EN 12791, 3 x 3ml, 3 x 1min. EN 14348 sur Mycobacterium terrae. NF T 72-300 selon NF T 72-150 sur Salmonella enterica et Listeria monocytogenes. NF T 72-170, 5min, conditions de propreté. Actif sur HIV, Rotavirus, Herpès simplex, BVDV (indicateur de l'hépatite C) et PRV (indicateur de l'hépatite B) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180. Actif sur Polio 1 min, Adénovirus 30 sec et sur H1N1 en 30 sec, selon la norme EN 14476.

**MODE D'EMPLOI : Traitement hygiénique :** Sur mains propres et sèches, appliquer une dose de produit 3 ml ; frotter mains, poignets, espaces interdigitaux, pourtour des ongles, pendant 30 sec au moins.  
**Désinfection chirurgicale :** Sur mains propres et sèches, appliquer 3 x 3 ml de produit ; frotter mains, poignets, avant-bras, coudes, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 3 x 1min.

Septigel + 30 ml	B1587YA301R	
Septigel + 100 ml	B1587PA800Q	
Septigel + 300 ml	B1587JAC00M	
Support flacon 300 ml	M2S003002	
Septigel + 500 ml	B1587JAH00E	
Support flacon 500 ml	N8A000000	
Septigel + 1L	B1587FAP016	
Septigel + 1L (cartouche)	M8A017000	
Distributeur Alphamouss L	M8A017000	